

Kérjük gondosan olvassa el mielőtt aláírja!

Ez a nyilatkozat felvilágosítja Önt a készülékes merülésnél felmerülő veszélyekre és arról hogy milyen magatartást kívánunk meg Öntől az edzések során. Az Ön aláírására van szükség van ahhoz, hogy részt vehessen ezen a felajánlott készülékes merülési oktatáson, melynek

oktatója: _____
 helye: _____
 város: _____
 ország: _____

Olvassa el és beszélje meg ezt a nyilatkozatot, mielőtt aláírja. A tanfolyamon való részvételhez ki kell töltenie ezt az Egészségügyi Nyilatkozatot, melynek van egy Kórelőzmény része. Amennyiben kiskorú, egyik szülővel alá kell íratnia ezt a Nyilatkozatot.

A búvárkodás izgalmas és fizikai igénybevételt megkövetelő tevékenység. Ha helyesen, megfelelő technikával végzik, akkor biztonságos. Veszélyes lehet azonban, ha nem tartják be az előírt biztonsági intézkedéseket.

A biztonságos készülékes merüléshez szükség van arra, hogy Ön ne legyen túlsúlyos, vagy leromlott fizikai állapotban. Bizonyos körülmények között a merülés megerőltető lehet. Légző és keringési rendszerének egészségesnek kell lennie. A légutaknak rendben és egészségesnek kell lenniük. Nem merülhetnek azok a személyek, akik szívbetegségben, megfázásban, epilepsziában, asztmában, vagy más súlyos egészségügyi problémában szenvednek, ill. alkohol vagy drog hatása alatt állnak. Amennyiben gyógyszert szed, beszéljen orvosával és az oktatóval, mielőtt részt venne a tanfolyamon. A készülékkel való merüléshez oktatójától meg kell tanulnia a légzéssel és a kiegyenlítéssel kapcsolatos biztonsági szabályokat is. A készülék helytelen használata komoly balesethez vezethet. Felkészült oktatók rendkívül alapos képzése szükséges a készülék biztonságos használatához.

Ha bármi kérdése lenne az Egészségügyi Nyilatkozatot, vagy a Kórelőzmény részt illetően, nézze át oktatójával mielőtt aláírja.

KÓRELŐZMÉNY

A résztvevőhöz:

Ennek az egészségügyi kérdőívnek a célja, hogy megállapítsa, hogy Önnek szüksége van-e orvosi vizsgálatra, mielőtt részt venne a hobby-búvár tanfolyamon. Amennyiben igennel válaszol az egyik kérdésre, az még nem feltétlenül zárja ki Önt a búvárkodás lehetősége alól. Egy igenlő válasz azt jelenti, hogy van már egy meglévő tényező, amely befolyásolhatja az Ön biztonságát a merülés során, és hogy Önnek ki kell kérnie az orvos véleményét.

Kérjük legyen szíves **IGEN** vagy **NEM** választ adni az Ön múltbéli és jelenlegi kórtörténetéről. Kérjük, hogy IGEN választ adjon mindazokra a kérdésekre, amelyekben nem biztos. Ha a listán szereplő problémák közül egy Önénél fennáll, meg kell kérnünk arra, hogy orvoshoz forduljon, mielőtt részt venne a tanfolyamon. Oktatója ad Önnek egy PADI Egészségügyi Nyilatkozatot, valamint egy útmutatót a Hobby Búvárkodás Egészségügyi Vizsgálatához, melyet orvosának át kell majd nyújtania.

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Terhes-e Ön, vagy próbálkozik teherbe esni jelenleg? | <input type="checkbox"/> Volt valaha búvár balesete vagy dekompRESSZIÓS betegsége? |
| <input type="checkbox"/> Rendszeresen szed-e csak vényre vagy anélkül is kapható gyógyszereket? (Kivétel az antibiÓti tabletták) | <input type="checkbox"/> Van Önnek krónikus hátfájása? |
| <input type="checkbox"/> Erre a kérdésre csak abban az esetben adjon igenlő választ, ha Ön 45 éves elmúlt és : | <input type="checkbox"/> Volt-e operálva a háta? |
| • jelenleg pipázik, cigarettázik, szivarozik | <input type="checkbox"/> Cukorbetegségben szenved? |
| • magas a koleszterinszintje | <input type="checkbox"/> Operációt, sérülést vagy törést követő hát, kar vagy láb probléma? |
| • családjában gyakori a szívbetegség és a szélütés | <input type="checkbox"/> Problémát jelent Önnek mérsékelt testedzést végezni (pl.: 12 perc alatt 1,6 km gyalogolni,) ? |
| Előfordult-e Önénél, vagy jelenleg is szenved az alábbi betegségek közül? | |
| <input type="checkbox"/> Asztma, sípoló légzés testedzéskor. | <input type="checkbox"/> Fenn áll Önénél magas vérnyomás ill. szed erre gyógyszert? |
| <input type="checkbox"/> Szénanátha vagy allergia súlyos, gyakori rohama. | <input type="checkbox"/> Bármiféle szívbetegség? |
| <input type="checkbox"/> Gyakori megfázás, arc és melléküreggyulladás (bronhitis). | <input type="checkbox"/> Szívroham bármilyen fajtája? |
| <input type="checkbox"/> Bármilyen tüdőbetegség. | <input type="checkbox"/> Angína, szív-műtét, érsebészeti műtét? |
| <input type="checkbox"/> Légmell (pneumotorax) | <input type="checkbox"/> Arcüreg műtét? |
| <input type="checkbox"/> Mellkasi operáció. | <input type="checkbox"/> Fülbetegség, hallássérülés, egyensúlyi problémák? |
| <input type="checkbox"/> Klausztrófia vagy agorafóbia (bezártság vagy tömeg-izony). | <input type="checkbox"/> Kiegyenlítési problémák (fűlpattogás) repüléskor vagy hegyekben? |
| <input type="checkbox"/> Viselkedési zavar. | <input type="checkbox"/> Vérzéssel rendelkezők, vérzékenység? |
| <input type="checkbox"/> Epilepszia vagy más rohamok, görcsök ill. ezek ellen szed gyógyszert? | <input type="checkbox"/> Sérv bármely fajtája? |
| <input type="checkbox"/> Visszatérő migrénes fejfájás vagy szed ez ellen gyógyszert? | <input type="checkbox"/> Fekély vagy fekély műtét? |
| <input type="checkbox"/> Volt-e eszméletvesztése, ájulása (teljes vagy részleges)? | <input type="checkbox"/> Vastagbél műtét? |
| <input type="checkbox"/> Van-e Önnek kintóziája (tengeri betegség, ugyanez autóban)? | <input type="checkbox"/> Drog vagy alkohol függőség? |

Az információ melyet kórtörténetemről nyújtok, legjobb tudomásom szerint pontos.

_____ aláírás

_____ dátum

_____ szülő vagy gyám, ha szükséges

_____ dátum

TANULÓ

Kérjük, szíveskedjen nyomtatott betűvel kitölteni.

Név _____ Születési Dátum _____ Kor _____
keresztnév vezetéknev

Levelezési Cím _____

Város _____ Megye _____

Ország _____ Irányítószám _____

Otthoni Telefon (_____) _____ Munkahelyi Telefon (_____) _____

FAX (_____) _____

A háziorvos neve és címe

Orvos _____ Kórház _____

Cím _____ Telefon (_____) _____

Az utolsó orvosi vizsgálat időpontja _____

Szakorvos _____ Kórház _____

Cím _____ Telefon (_____) _____

Volt-e orvosi vizsgálatnak alávetve bűvarkodás miatt? Igen Nem Ha igen, mikor? _____

ORVOS

A fent említett személy sűrített-levegős könnyűbúvár tanfolyamra jelentkezik, vagy jelenleg könnyűbúvárként van nyilvántartva (önálló vízalatti légzőkészülékes merüléseknél). Kérjük , hogy adjon véleményt a megnevezett személy egészségügyi állapotáról a sűrített-levegős könnyűbúvárkodás szempontjából. Kérem, szíveskedjen átnézni a Hobby Búvárkodás Egészségügyi Vizsgálatához kiadott útmutatót.

Az orvos szakvéleménye

- Nem találtam semmi olyan egészségügyi problémát, amely összeférhetetlen a sűrített-levegős könnyűbúvárkodással.
- A megvizsgált személynek nem javaslom a sűrített-levegős könnyűbúvárkodást.

Megjegyzés

Átnéztem a Hobby Búvárkodás Egészségügyi Vizsgálatához kiadott útmutatót.

Dr _____, P.H. Dátum _____
Vizsgáló Orvos Aláírása

Orvos _____ Kórház _____

Cím _____

Telefon (_____) _____

Útmutató a kedvtelési légzőkészülékes búvárok orvosi vizsgálatához

Tájékoztató az orvos részére:

A kedvtelési légzőkészülékes búvárok kiváló biztonsági története van. Ahhoz, hogy fenntartsuk ezt az állapotot, fontos az orvosi vizsgálat, hogy kiszűrjék az olyan elégtelenségeket, amelyek a víz alatti környezetben a hallgatókat veszélybe sodorhatják.

A kedvtelési légzőkészülékes búvárok vizsgálata tartalmazza a kórtörténet egyes részeit, a rendszerek működésének átnézését és az orvosi vizsgálatot. Arra dolgozták ki, hogy olyan körülményeket tárjanak fel, amelyek a búvárt nagy eséllyel teszik ki a dekompressziós betegségnek, a tüdőfelfújódási szindrómának és az ezzel együtt járó agyembóliának és eszméletvesztésnek, amely fulladáshoz vezethet. Emellett a búvárnak képesnek kell lennie bizonyos mértékű hideg elviselésére, megbirkózni a víz optikai hatásaival és legyenek fizikai és mentális tartalékai, hogy a lehetséges vészhelyzetekkel meg tudja küzdeni.

A kórtörténetnek, a rendszerek működése átnézésének és az orvosi vizsgálatnak minimálisan tartalmaznia kell az alább felsorolt pontokat. Az ellenjavallatok listája (relatív és abszolút) nem teljes. Csak a leggyakrabban előforduló orvosi problémákat tartalmazza. A rövid bevezetők arra szolgálnak, hogy figyelmeztessék az orvost a búvár számára kockázatot jelentő orvosi problémák tulajdonságaira és, hogy vezessék a páciens egészségi állapotának felmérésekor.

A diagnózis tanulmányokat és a konzultációkat a specializáció tekintetében a jelzett módon kell beszerezni, hogy az orvos kellőképpen felmérhesse a búvár állapotát. Egy referencialista is megtalálható, amely segít tisztázni azokat a problémákat, amelyek felmerülnek. Orvosok a Búvár Készültségi Hálózatnál (DAN) konzultáció céljából elérhetők telefonon (919) 684-2948 normál nyitvatartási időben. Sürgősségi hívásokra 24 órán belül a hét 7 napján a (919) 684-8111 számon.

Némely egészségi állapot abszolút ellenjavallatnak minősül a búvárok szemponyjából. Ezek a specifikus állapotok, amelyek abszolút ellenjavallatnak minősülnek, a búvárt megnövekedett mértékben teszik ki a sérülés vagy halál kockázatának. Mások relatív ellenjavallatnak minősülnek a légzőkészülékes merülés szempontjából, amelyeket idővel és megfelelő orvosi beavatkozással meg lehet oldani. Legvégül az orvosnak kell eldöntenie az egyénnel együtt, hogy a páciens egészségi állapotáról szerzett információk alapján, fizikailag alkalmas-e a légzőkészülékes merülésben való részvételre.

Minden körülmények között emlékezzen arra, hogy a légzőkészülékes merülés kedvtelési sport és élvezetet kell, hogy jelentsen, nem pedig betegség vagy halál oka legyen.

Szív- és érrendszer

Relatív ellenjavallatok: Az alább felsorolt diagnózisok képtelenné teszik a búvárt, hogy megfeleljen azoknak az erőfeszítési elvárásoknak, amelyekkel a kedvtelési búvárok közben találkozhatnak. A felsorolt diagnózisok oda vezethetnek, hogy a búvár szívelégtelenséget és annak következményeit tapasztalja. Szabványos terheléses vizsgálat javasolt akkor, ha bármilyen kétely merül fel a fizikai teljesítőképességgel kapcsolatban. A terheléses vizsgálat javasolt minimális értéke ilyen esetekben 13 METS. A kritériumok elégtelen teljesítése kizáró ok. A kondicionálás és a vizsgálat későbbi megismétlése lehetővé teszi a kvalifikációt.

- CABG vagy PCTA CAD-hoz előzmény
- Miokardiális infarktus előzmény
- Magas vérnyomás
- Dysrhythmiás előzmények, amelyek kezeléséhez gyógyszereket használtak
- Billentyűelégtelenség
- Aszimptomás mitrális billentyű prolapsus
- Pacemakerek – Meg kell nevezni a patológiai folyamatot, amely szükségessé tette a szívritmus szabályozást a búvárok tekintetében. Végül azokban az esetekben, ahol a probléma (amely miatt a szívritmus szabályozásra szükség volt) nem zárja ki a merülést, képes lesz-e a búvár megfelelni a követelményeknek?

Megjegyzés: A pacemakereknek a gyártó által kibocsátott igazolással kell rendelkezniük, hogy képesek elviselni a kedvtelési búvárok járó nyomásváltozásokat (130 láb mélységig a tengervízben).

Abszolút ellenjavallatok: A dekompresszió alatt létrejövő vénás gázembólia áthatolhat a szíven belüli érhálózatban és bekerülhet az agyi vérkeringésbe, ami katasztrófális következményekkel járhat. Az aszimmetrikus szeptális hypertróphia és a billentyű stenosis a gyakorlatok alatt azonnali eszméletvesztéshez vezethet.

- Kongesztív szívbetegség

A tüdő

Bármely folyamat vagy sérülés, amely akadályozza a tüdőből való kiáramlást, a búvárt kiteszi a tüdőfelfújódás veszélyének alveoláris szakadással és az agyi légembólia lehetőségével. Az asztma (reaktív légúti betegség), COPD krónikus obstruktív légúti betegségek, cisztikus vagy üregképződéssel járó tüdőbetegségek mind a levegő bennmaradásához vezethetnek. Spirometriát, provokatív tesztek, mint a metacholin provokáció és más tanulmányok, amelyeket a légbezáródás felderítésére dolgoztak ki, kell elvégezni a vizsgálat orvos megnyugtatóra, hogy bizonyos legyen, a búvár nincs veszélyben. A pneumothorax megjelenése vagy újra megjelenése merülés közben katasztrófális következménnyel jár. Ahogy a búvár emelkedik az üregben maradt levegő nagyon gyorsan kitágul, tenziós pneumothorax-ot hozva létre.

Relatív ellenjavallatok:

- Előzetes asztma vagy reaktív légúti betegség kórtörténete. (RAD)*
- Gyakorlat vagy hideg által kiváltott bronchospasmus kórtörténete (EIB)*
- Szolid, cisztikus vagy üregképződéssel járó léziók kórtörténete.*
- Thoracticus műtét*, traumát vagy mellhártyaszakadást*, előzetes tüdőfelfújódásos sérülést* követő pneumothorax.
- Restriktív betegségek**

(*Ki kell zárni a levegő bennrekedését)

(**Szükséges a gyakorlatok közbeni tesztelés)

Abszolút ellenjavallatok:

- **Aktív RAD (Asztma), EIB, COPD vagy ugyanilyen kórtörténet abnormális légzésfunkciós teszttel (PFT) vagy pozitív provokáció**
- **Restriktív betegségek amelyek a gyakorlatok gyengülésével járna**
- **Spontán pneumothorax kórtörténete**

Idegrendszer

Azokat az idegrendszeri rendellenességeket, amelyek a bűvár gyakorlatvégző képességeit befolyásolják, különállóan kell értékelni a súlyosság mértékétől függően.

Relatív ellenjavallatok:

- **Migrénes fejfájások amelyek tünetei vagy súlyossága gyengíti a motoros vagy észlelő funkciókat.**
- **Fejsérüléssel előzmények, amelynek görcsrohamtól eltérő következménye volt**
- **Sejtmag sérülés**
- **Perifériás neuropátia**
- **Trigeminális neuralgia**
- **Gerincvelő vagy agysérülés kórtörténete, amely nem okozott maradandó neurológiai sérülést**
- **Agyi gázembólia kórtörténete maradandó tüdőbeli légbeszűrésrel, amelyet kizártak**
- **Agyvérzés görcsroham nélkül**

Abszolút ellenjavallatok: Azoknál a rendellenességeknél, ahol az öntudat mértéke jelentősen csökkenhet, a bűvár ki van téve a fulladás veszélyének. Azok a bűvárok, akiknek gerincvelő vagy valamilyen agybetegségük van és ennek folytán, a keringésük gyengült fokozottan ki vannak téve a gerincvelő vagy agyi dekompressziós betegségeknek.

- **Kórtörténet a görcsökről, amelyek nem a gyerekkori lázas görcsök közé tartoznak**
- **Intracraniális tumor vagy aneurizma**
- **TIA vagy CVA kórtörténet**
- **Gerincvelő sérülés kórtörténete, betegség vagy műtét maradandó következményekkel**
- **Kórtörténet Kettes típusú (mellék és/vagy központi idegrendszer) dekompressziós betegségről amely maradandó neurológiai hiányosságokkal jár**

Orr –fül –gégészet

Merülés és feljövétel közben ki kell egyenlíteni a nyomást a környező víz, a külső hallójárat a középfül és az orrüreg között. Ennek elmulasztása a legenyhébb esetben is fájdalommal jár, de a legrosszabb esetben az eltömött üregek károsodásával, aminek bénító és valószínűleg halálos kimenetele lehet.

A belső fül folyadékkal van töltve és ezért nem összenyomható. A hajlékony határfelületek a középfül és a belső fül között, a kerek és ovális dobüregi ablakok, azonban érintve vannak a nyomásváltozásokban. Az előzőleg sérült de már begyógyult kerek és ovális ablak membránok a sérülés megnövekedett veszélyének vannak kitéve akkor, ha nem megfelelően egyenlíti ki valaki a nyomást vagy megfelelő túlnyomásakor élénk Valsalva manőverek esetén.

A gége és a garat bármiféleféle a levegő áramlást akadályozó dologtól mentes kell legyen. A gége és a gégefedő normálisan kell, hogy működjön, hogy megakadályozza a belélegzést.

Az alsó és felsőállkapcsi funkciók meg kell hogy engedjék a páciensnek, hogy a szájában tartsa a légzőkészülék csutoráját. Azok az egyének, akiknek valamilyen arcüregi törésük volt hajlamosak lehetnek a nyomásváltozásra és ez az érintett, levegővel teli üregek összeroppanását eredményezheti.

Relatív ellenjavallatok:

- **Visszatérő külső hallójárat gyulladás**
- **A külső hallójárat jelentős elzáródása**
- **A fülcimpa jelentős fagyásos sérülésének kórtörténete**
- **Az Eustach-kürt diszfunkciója**
- **Visszatérő közép és belső fül gyulladás**
- **Dobhártya perforáció kórtörténete**
- **Dobhártyaplasztika kórtörténete**
- **Mastoidectomia kórtörténete**
- **Jelentős vezetési vagy érzőideg halláskárosodás**
- **Nervus facialis bénulás *nem barotrauma*val összefüggésben**
- **Teljes szájsebészeti eszközök**
- **Arcüregi törések kórtörténete**
- **Be nem gyógyult szájsebészeti helyek**
- **Fej és/vagy nyak terápiás kezelésének kórtörténete**
- **Izületi diszfunkció kórtörténete**

Abszolút ellenjavallatok:

- **Monomer dobhártya**
- **Nyílt dobhártyaperforatio**
- **Cső myringotomia**
- **Kengyel stapedectomia kórtörténete**
- **Hallócsontok műtétjének kórtörténete**
- **Belső fül műtét kórtörténete**
- **Belső fül ovális ablak sérülés kórtörténete**
- **Nervus facialis bénulás *barotraumával összefüggésben***
- **A belső fül presbycusistól különböző egyéb betegségei**
- **Nem korrigált felső légúti akadály**
- **Laryngectomia vagy status post partialis laryngectomia**
- **Tracheostomia**
- **Nem korrigált laryngokele**
- **Vestibularis dekompressziós betegség kórtörténete**

Gyomor- és bélrendszer

Relatív ellenjavallatok: Úgy, mint más szervrendszereknél és betegségi stádiumoknál minden folyamat, amely krónikusan gyengíti a bűvárt, hátrányosan befolyásolhatja a teljesítményt a gyakorlat során. Emellett a bűvártevékenység távoli helyeken, orvosi beavatkozás lehetősége nélkül történhet. Figyelembe veendő a magatehetetlenség vagy a halálos tünetek ismétlődésének lehetősége.

- **Peptikus gyomorfekély**
- **Gyulladásos bélbetegség**
- **Malabsorptiós állapotok**
- **Posztgasztrektómiás ürítési syndroma**
- **Paraesophag vagy hiatus hernia**

Abszolút ellenjavallatok: A műtét vagy eredeti rossz kialakulás miatt megváltozott anatómiai viszonyok, melyek gázcsapda kialakulásához vezethetnek, komoly problémákat okozhatnak. Egy üregben megrekedt gáz a bűvár felszínre emelkedésekor kiterjed és ez sérüléshez, vagy ha ez a gyomor-és bélrendszer felső részében történik, hányáshoz vezethet. A víz alatti hányásfulladást okozhat.

- **Gyomorürülési zavarok**
- **Krónikus vagy visszatérő vékonybél-szűkület**
- **Bélfisztula, mely nem ürül szabadon**
- **Nyelőcső divertikulum**
- **Achalasia**
- **Az alsó hasfal helyreállítatlan sérvei, melyek potenciálisan vékonybelet tartalmazhatnak**

Anyagcsere és endokrinológia

Relatív ellenjavallatok: A diabetes mellitus kivételével a megváltozott hormonális vagy anyagcsere funkciókat aszerint kell értékelni, milyen hatásuk van az egyénnek arra a képességére, hogy elviselje a sport-bűvárkodás mérsékelt fizikai követelményeit és a környezeti stresszt. Általában a megváltozott hormonális állapotú bűvároknak amennyire csak lehet, az optimálisához lehető legközelebbi fiziológiai állapotban kell lenniük. Meg kell jegyezni, hogy az elhízottság eleve hajlamossá teszi az egyént a dekompressziós betegségre és a gyenge általános fizikai állapot egyik jele.

- **Hormon túltengés vagy hiány**
- **Elhízottság**
- **Veseelégtelenség**

Abszolút ellenjavallatok: A cukorbetegség inzulinos vagy szájon áttörtenő anti-hypoglycemiás gyógyszeres kezelése során a hypoglycemiához társuló potenciálisan gyors öntudatváltozási szintfulladást eredményezhet. A merülés ennél fogva ellenjavallt.

Terhesség

A dekompresszió során kialakuló vénás gázembólia magzati elváltozásokat okozhat. **Így a terhesség bármely szakaszában a merülés abszolút ellenjavallt.**

Hematológia

A megváltozott reológiai tulajdonságokból következő rendellenességek növelik a dekompresziós betegség kockázatát.

Relatív ellenjavallatok:

- Sarlósejtes jelek
- Akut anémia

Abszolút ellenjavallatok:

- Sarlósejtes anémia
- Polycythemia
- Leukémia

Ortopédia

Értékelní kell a mozgás relatív elégtelenségét, különösen a kishajó környezetben vagy a parton, felszereléssel, ami 40 fontnál nem nehezebb.

A gyakorlatvégző képesség hatása is fontos kérdés.

Relatív ellenjavallatok:

- Krónikus hátfájás
- Amputáció
- Scoliosis – értékelní kell a tudóműködésre gyakorolt hatását
- Aseptikus necrosis – a betegség előrehaladásának lehetséges kockázata, amely összefügghet a dekompreszióhoz való alkalmazkodással.

Magatartás

Magatartás: A bűvár szellemi kapacitása és érzelmi állapota mind fontosak a biztonságos merüléshez. A hallgatónak elégséges tanulóképességgel kell rendelkeznie, hogy megmaradjon benne az információ, amelyet az oktatók tárnak elé, képes legyen biztonságosan megtervezni és kivitelezni a saját merüléseit, és reagálni a változásokra a víz alatti környezetben. A hallgató motivációja a bűvárkodás elsajátítása iránt, és a képessége, hogy a potenciálisan veszélyes szituációkkal megbirkózzon egyaránt fontosak a biztonságos bűvárkodáshoz.

Relatív ellenjavallatok:

- Túl lassú fejlődés
- Droggal vagy alkohollal való visszaélés kórtörténete
- Megelőzően előforduló pszichotikus epizódok kórtörténete

Abszolút ellenjavallatok:

- A nem megfelelő motiváció a bűvárkodás iránt – kizárólag a házastárs vagy társ kedvéért, hogy bizonyítson magának a saját félelmei ellenében
- Klausztrófia vagy agorafóbia
- Aktív pszichózis vagy pszichotropikus gyógyszerek szedése folyamatban
- Pánikbetegség kórtörténete
- Droggal vagy alkohollal való visszaélés

Bibliográfia

1. Physician's Guide to Diving Medicine. Shilling et al, Plenum Pub. 1982
2. Diving and Subaquatic Medicine, 2nd Ed., Edmonds, Lowry, Pennfeather, Diving Med Centr, 1978
3. Fitness to Dive 34th UHMS Workshop, Vorosmarti (ed.), Chaired by Linaweaver, UHMS Pub No#70, 1987
4. Medical Examination of Sport Scuba Divers, 2nd Ed., Davis Medical Seminars Inc., 1986
5. Hyperbaric and Undersea Medicine, Davis, Medical Seminars Inc. 1981

Jóváhagyták

Paul A. Thombs, M.D.
Medical Director
Hyperbaric Medical Center
St. Luke's Hospital, Denver, CO

Keith Van Meter, M.D., F.A.C.E.P.
Assistant Clinical Professor of Surgery
Tulane University School of Medicine

Peter Bennett, Ph.D., D.Sc.
Duke University Medical Center
Durham, NC

Robert W. Goldmann, M.D.
St. Luke's Hospital
Milwaukee, WI

Richard E. Moon, M.D., F.A.C.P., P.C.C.P.
Departments of Anesthesiology and Pulmonary Medicine
Duke University Medical Center
Durham, NC

Paul G. Lineaweaver, M.D., F.A.C.P.
Santa Barbara Medical Clinic
Undersea Medical Specialist

Roy A. Myers, M.D.
MIEMS
Baltimore, M.D.

James Vorosmarti, M.D.